

PROTECTION CONTRE LA DIPHTÉRIE ET LE TÉTANOS

Qu'est-ce que le tétanos (maladie de la « mâchoire bloquée »)?

Le tétanos est causé par une bactérie présente dans le sol, la poussière et le fumier. Si cette bactérie infecte une plaie, elle peut produire un poison qui cause de graves spasmes musculaires généralisés et peut même entraîner la mort. Les muscles de la mâchoire peuvent se contracter; il est alors impossible d'ouvrir la bouche. Soixante pour cent des personnes qui contractent le tétanos en meurent.

Qu'est-ce que la diphtérie?

La diphtérie est causée par une bactérie qui infecte le nez et la gorge et qui entraîne une difficulté à respirer. Elle peut aussi causer des infections de la peau et des oreilles, une insuffisance cardiaque, des dommages aux nerfs ou même la mort. Dix pour cent des personnes qui contractent la diphtérie en meurent.

Vaccin contre la diphtérie et le tétanos

Les vaccins constituent le meilleur moyen de protection contre certaines infections très graves. Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT) est un vaccin « deux en un » fréquemment administré, qui est utilisé depuis de nombreuses années. Ce vaccin est administré aux adultes et aux enfants de sept ans et plus. Il peut être administré comme vaccin de rattrapage à une personne n'ayant pas reçu toutes les doses de la série vaccinale lorsqu'elle était plus jeune, comme dose de rappel pour les adultes tous les 10 ans ou pour prévenir l'infection possible d'une plaie par le tétanos. Ce vaccin est administré dans le muscle du bras.

Existe-t-il des effets secondaires?

Les effets secondaires du vaccin dT sont bénins et ne durent que quelques jours. Une douleur légère, une enflure et une rougeur au point d'injection sont des effets fréquents. Une faible fièvre, une perte d'appétit ou de la fatigue peuvent survenir un ou deux jours après l'administration du vaccin. Des effets secondaires ou des réactions allergiques graves (p. ex. une anaphylaxie, de l'urticaire et une difficulté à respirer) peuvent survenir à la suite de l'administration de n'importe quel vaccin, bien que ce soit inhabituel. Communiquez immédiatement avec votre médecin de famille ou rendez-vous sur-le-champ au service d'urgence le plus près de chez vous si vous présentez des réactions graves.

À qui le vaccin ne devrait-il pas être administré?

- Les enfants de moins de sept ans
- Les personnes qui ont reçu une dose du vaccin contre le tétanos au cours des cinq dernières années
- Les personnes atteintes d'une infection ou qui ont une forte fièvre
- Les personnes allergiques à l'un des composants du vaccin ou qui ont des antécédents d'une réaction grave à ce vaccin.

**Pour obtenir des renseignements
ou des services supplémentaires,
communiquez avec votre régie
régionale de la santé dont le
numéro apparaît dans les pages
blanches de votre annuaire
téléphonique.**